

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : 後) CDDP+アリムタ+アハ<sup>®</sup>スチン(フレズミンS・パ<sup>®</sup>ンビ<sup>®</sup>タン必須)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)アリムタ注射用※	500mg/m2		525mg/m2
04	点滴静注	(化)シス <sup>®</sup> ラチン点滴静注「マルコ」※	75mg/m2		80mg/m2
05	点滴静注	(化)アハ <sup>®</sup> スチン点滴静注用※	15mg/kg		15.8mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴静注	デキサト注射液(デ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ロン後発)※ ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 後) CDDP+アリムタ+アハ <sup>®</sup> スチン(フレズミンS・パ <sup>®</sup> ンビ <sup>®</sup> タン必須) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	9.9mg 0.3mg 100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)アリムタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 後) CDDP+アリムタ+アハ <sup>®</sup> スチン(フレズミンS・パ <sup>®</sup> ンビ <sup>®</sup> タン必須) 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: 後) CDDP+アリムタ+アハ <sup>®</sup> スチン(フレズミンS・パ <sup>®</sup> ンビ <sup>®</sup> タン必須) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)シス <sup>®</sup> ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバ <sup>®</sup> ック <sup>®</sup> 「テルモ」 療法名: 後) CDDP+アリムタ+アハ <sup>®</sup> スチン(フレズミンS・パ <sup>®</sup> ンビ <sup>®</sup> タン必須) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)アハ <sup>®</sup> スチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 後) CDDP+アリムタ+アハ <sup>®</sup> スチン(フレズミンS・パ <sup>®</sup> ンビ <sup>®</sup> タン必須) 点滴静注:  <次ページあり>	0mg 100mL		投与順 5						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : 後)CDDP+アリムタ+アバ スチン(フスミンS・パ ンビ タン必須)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		*点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	ラクテック注 500mL ソフトバック 療法名:後)CDDP+アリムタ+アバ スチン(フスミンS・パ ンビ タン必須) 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		2回						
07	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:後)CDDP+アリムタ+アバ スチン(フスミンS・パ ンビ タン必須) 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		2回						
08	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CDDP+アリムタ+アバ スチン(フスミンS・パ ンビ タン必須) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 100mL			1回	1回	1回			

RP	オーダーコメント
04	全量を500mlとする。
05	アリムタ投与後、30分を空けてCDDPを投与すること。 初回のみ90分、次回から60~90分で。