

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : PEM + CBDCA + BEV

レジメン説明 : 2015移行により生成
2020/07/08 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)アリムタ注射用※	500mg/m2		525mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※	0mg		900mg
06	点滴静注	(化)アハスチン点滴静注用※	15mg/kg		15.8mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	カルテマ3A 輸液500mL 療法名:PEM + CBDCA + BEV 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PEM + CBDCA + BEV 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	デキサート注射液(デキサトロン後発)※ グレースロン静注液3mg「NK」 3mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PEM + CBDCA + BEV 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	4.95mg 3mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)アリムタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PEM + CBDCA + BEV 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:PEM + CBDCA + BEV	0mg 250mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : PEM + CBDCA + BEV

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)アパ [®] スチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PEM + CBDCA + BEV 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
06	忍容性良ければ2回目90分、3回目以降30分まで短縮可