

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後)ジェム (GEM) +シス (CDDP)

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day8 | | | | | | |
|----|------|--|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | 投与経路:末梢ルートメイン1 | | | | | | | | | |
| 08 | 点滴静注 | 20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:後)ジェム (GEM) +シス (CDDP) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 300mL | | | | | | | | |
| 09 | 点滴静注 | デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)ジェム (GEM) +シス (CDDP) 点滴静注: *点滴時間 0時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 8.25mg 100mL | | | | | | | | |
| 10 | 点滴静注 | デキサト注射液(デカトロン後発)※ ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)ジェム (GEM) +シス (CDDP) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 6.6mg 1A 100mL | | 投与順 2 | | | | | | |

| RP | オーダーコメント |
|----|---------------|
| 01 | キープ |
| 10 | ジェムサールの投与30分前 |