

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : monthly CBDCA + PTX

レジメン説明 : 2015移行により生成

2018/2/26主科医師より修正依頼あり、PTX : 180mg/m<sup>2</sup>→200mg/m<sup>2</sup>、グレセトン→アロキシ (位置も) 変更

2019/3/7 PTXに0.22μm以下のフィルター使用のコメント追加

2019/9/26 サツク→カスターへ変更

2020/07/08 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)パクリタセル点滴静注液※	200mg/m <sup>2</sup>		210mg/m <sup>2</sup>
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:monthly CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1							
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:monthly CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2							
03	点滴静注	デキサート注射液(テカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL アロキシ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:monthly CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 1A 1A 0.75mg 100mL		投与順 3							
04	点滴静注	(化)パクリタセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:monthly CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 3時間で <次ページあり>	0mg 500mL		投与順 4							

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : monthly CBDCA + PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		投与経路:末梢サブルート1									
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:monthly CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 5						

RP	オーダーコメント
04	0.22μm以下のフィルター使用