

呼吸器内科

レジメン名称 : weekly CBDCA+PTX

レジメン説明 : 2017/2/22 RT併用時に誤ってPTX : 60mg/m2とならないよう、Dr. 丈達確認の上、PTX : 40mg/m2 (上限 : 60mg/m2) へと変更  
 2019/3/7 PTXに0.22 μm以下のフィルター使用のコメント挿入  
 2019/9/26 サツタカ→カスターへ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	40mg/m2		60mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		360mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:weekly CBDCA+PTX 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:weekly CBDCA+PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 1A 1A 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:weekly CBDCA+PTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	ラモトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:weekly CBDCA+PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.3mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注  <次ページあり>	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL プラボトル	0mg 250mL		投与順 5						





呼吸器内科

レジメン名称 : weekly CBDCA+PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15							
01	点滴静注	ルテム3A 輸液500mL 療法名:weekly CBDCA+PTX 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1							
02	点滴静注	デキサト注射液(デカロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:weekly CBDCA+PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 1A 1A 100mL		投与順 2							
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:weekly CBDCA+PTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3							
04	点滴静注	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:weekly CBDCA+PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.3mg 100mL		投与順 4							
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:weekly CBDCA+PTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 5							

RP	オーダーコメント
03	0.22μm以下のフィルター使用