

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器)

レジメン説明 : 2019/1/28 レジメン承認  
2020/07/08 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)キイトルーダ <sup>®</sup> 点滴静注※	200mg		200mg
05	点滴静注	(化)アブ <sup>®</sup> ラキサン点滴静注用100mg	100mg/m2		105mg/m2
06	点滴静注	(化)カルボ <sup>®</sup> プラチン点滴静注液「サト <sup>®</sup> 」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメント <sup>®</sup> 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	デキサート注射液(テカト <sup>®</sup> 後発)※ アブキ <sup>®</sup> 静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	4.95mg 0.75mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)キイトルーダ <sup>®</sup> 点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)アブ <sup>®</sup> ラキサン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器)	0mg 50mL		投与順 5						
	<次ページあり>										



インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL								
02	点滴静注	プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL								
03	点滴静注	デキスト注射液(7カトロン後発)※ アロキン静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	4.95mg 0.75mg 100mL								
04	点滴静注	(化)キイトルーダ点滴静注※ 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL								
05	点滴静注	(化)アブラキサン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
07	点滴静注 <次ページあり>	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器)	100mL		投与順 1						



インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL								
02	点滴静注	プロイマド点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL								
03	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ アロキソ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	4.95mg 0.75mg 100mL								
04	点滴静注	(化)キトルダ点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL								
05	点滴静注	(化)アブラキサン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「カト」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
07	点滴静注 <次ページあり>	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器)	100mL		投与順 1						

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
		点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1									
08	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2~5μmのフィルター使用
05	フィルターを通さないこと
07	ルートキープ