

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Pembrolizumab + CBDCA + PEM (呼吸器)

レジメン説明 : 2019/1/28 レジメン承認
2020/07/08 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)キイトルーダ [®] 点滴静注※	200mg		200mg
05	点滴静注	(化)アリムタ注射用※	500mg/m2		525mg/m2
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト [®] 」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Pembrolizumab + CBDCA + PEM (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 160分で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメント [®] 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + CBDCA + PEM (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	アロキ [®] 静注0.75mg 5mL デキサート注射液(デ [®] カト [®] ロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + CBDCA + PEM (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)キイトルーダ [®] 点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Pembrolizumab + CBDCA + PEM (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)アリムタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + CBDCA + PEM (呼吸器)	0mg 100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Pembrolizumab + CBDCA + PEM (呼吸器)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:Pembrolizumab + CBDCA + PEM (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2~5μmのフィルター使用