

呼吸器内科

レジメン名称：Pembrolizumab + PTX + CBDCA（呼吸器）

レジメン説明：2019/1/28 レジメン承認  
 2019/9/26 ガンタック→ガスターへ変更  
 2020/07/08 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式：男性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式：男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)キイトルーダ <sup>®</sup> 点滴静注※	200mg		200mg
05	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	200mg/m2		210mg/m2
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト <sup>®</sup> 」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Pembrolizumab + PTX + CBDCA（呼吸器） 点滴静注： *点滴時間 5.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメント <sup>®</sup> 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + PTX + CBDCA（呼吸器） 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	デキサート注射液(デカト <sup>®</sup> ロン後発)※ ガスター注射液20mg 2mL ホ <sup>®</sup> ラミン注 5mg 1ml アロキシ <sup>®</sup> 静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + PTX + CBDCA（呼吸器） 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 20mg 5mg 0.75mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)キイトルーダ <sup>®</sup> 点滴静注※ 生理食塩液 50mL フラボ <sup>®</sup> トル 療法名:Pembrolizumab + PTX + CBDCA（呼吸器） 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 4						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Pembrolizumab + PTX + CBDCA (呼吸器)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
05	点滴静注	(化)パ <sup>レ</sup> クリキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバ <sup>グ</sup> 療法名:Pembrolizumab + PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 5						
06	点滴静注	(化)カルボ <sup>プ</sup> ラチン点滴静注液「サト <sup>レ</sup> 」※ 生理食塩液 250mL ソフトバ <sup>グ</sup> 療法名:Pembrolizumab + PTX + CBDCA (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2~5 μ mのフィルター使用
05	0.22 μ m以下のフィルター使用