

呼吸器内系

レジメン名称 : Pembrolizumab+PEM(呼吸器)

レジメン説明 : 2019/1/28 レジメン承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)キイトルーダ [®] 点滴静注※	200mg		200mg
04	点滴静注	(化)アリムタ注射用※	500mg/m2		525mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab+PEM(呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 70分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab+PEM(呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2							
03	点滴静注	(化)キイトルーダ [®] 点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Pembrolizumab+PEM(呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3							
04	点滴静注	(化)アリムタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab+PEM(呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4							

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2~5μmのフィルター使用