

呼吸器内科 【Pembrolizumab + Cレジメン名称 : 【q6w】 Pembrolizumab (呼吸器)

レジメン説明 : 2020/9/4承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|------|------------------------------|----------|-----|-------|
| 02 | 点滴静注 | (化)キイトルーダ [®] 点滴静注※ | 400mg | | 400mg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | | | | | | |
|----|------|--|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【q6w】 Pembrolizumab (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 100mL | | 投与順 1 | | | | | | |
| 02 | 点滴静注 | (化)キイトルーダ [®] 点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラホ [®] トル 療法名: 【q6w】 Pembrolizumab (呼吸器) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 50mL | | 投与順 2 | | | | | | |

| RP | オーダーコメント |
|----|---|
| 01 | ルートキープ |
| 02 | インラインフィルター (0.2~5μm) を使用すること 希釈後の濃度が1~10mg/mLとなること |