

呼吸器内糸

レジメン名称 : Atezolizumab+CBDCa+nab-PTX 呼吸器

レジメン説明 : 2019/12/26承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg	1200mg		1200mg
05	点滴静注	(化)アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/m2		105mg/m2
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCa+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCa+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	アブキサン静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCa+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCa+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)アブラキサン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCa+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: <次ページあり>	0mg 50mL		投与順 5						

呼吸器内科

レジメン名称 : Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注	生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL								
02	点滴静注	ポイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL								
03	点滴静注	アピキ静注0.75mg 5mL デキスト注射液(デキストン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL								
04	点滴静注	(化)テントリク点滴静注1200mg 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
05	点滴静注	(化)アブラキソ点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
07	点滴静注 <次ページあり>	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器	100mL		投与順 1						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL								
02	点滴静注	プロイソト点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL								
03	点滴静注	アロキシ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL								
04	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
05	点滴静注	(化)アプタキサン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						
06	点滴静注	(化)カボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
07	点滴静注 <次ページあり>	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器	100mL		投与順 1						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
		点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1									
08	点滴静注	デキサト注射液(デカロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	血管痛発現時は60分に延長可
04	0.2~5μmのフィルター使用 忍容性が良ければ、2回目以降は30分に短縮可
05	フィルターを使用しないこと
07	ルートキープ