

インターバル日数 : 42 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科【Ipi + Nivo + CTx】レジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM

レジメン説明 : 2021/1/8承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※	360mg		360mg
06	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL	1mg/kg		1.05mg/kg
07	点滴静注	(化)アリムタ注射用※	500mg/m2		525mg/m2
08	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	アロキシ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注:	100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 42 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科【Ipi + Nivo + CTx】レジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22						
		点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1									
08	点滴静注	(化)カネブリン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22 μ mのフィルター使用
05	オプジーホ投与後からヤホイ開始までの30分間インターバル用
06	0.2~1.2 μ mのフィルター使用 終濃度 : 1~4mg/mL (25kg未満は生食量を調整すること)