

呼吸器内科

レジメン名称 : CDDP + S-1療法

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2018/8/10 ガイフ変更に伴い修正

適用条件 : ★CDDPはday8に投与

- <S-1>
- ★80mg/m2を1日2回に分けて服用
- ★Day1~21内服→1~2週休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184  
AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	60mg/m2		65mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名: CDDP + S-1療法 点滴静注: *点滴速度 100mL/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」2mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CDDP + S-1療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 9.9mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液1000mL ソフトバック「テルモ」 療法名: CDDP + S-1療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 1L		投与順 3						
04	点滴静注	ガイフ輸液 500mL バック 療法名: CDDP + S-1療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL		投与順 4						
05	点滴静注 <次ページあり>	ソルテム3A 輸液500mL 療法名: CDDP + S-1療法	500mL		投与順 5						

呼吸器内科

レジメン名称 : CDDP + S-1療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
02	アプレピタントの併用が推奨。day2、day3にデキサメタゾン8mgの投与が推奨。CDDPの投与30分前
03	CDDPの分は生食を捨てる