

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : CBDCA + S-1療法

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2020/07/08 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件 : &lt;S-1&gt;

- ★80mg/m<sup>2</sup>を1日2回に分けて服用
- ★2週内服→1週休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)カホ <sup>®</sup> プラチン点滴静注液「サト <sup>®</sup> 」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	ソルテ <sup>®</sup> ム3A 輸液500mL 療法名:CBDCA + S-1療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメント <sup>®</sup> 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CBDCA + S-1療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	グ <sup>®</sup> ラセト <sup>®</sup> ン静注液3mg「NK」 3mL デ <sup>®</sup> キサート注射液(デ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CBDCA + S-1療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)カホ <sup>®</sup> プラチン点滴静注液「サト <sup>®</sup> 」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:CBDCA + S-1療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ