

呼吸器内科

レジメン名称 : CDDP+Weekly VNR

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2018/8/10 ワンオフパックに変更のため修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ナベルピン注※	25mg/m2		26mg/m2
05	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	80mg/m2		85mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名: CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	ゲラセトン静注液3mg「NK」 3mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 9.9mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ナベルピン注※ 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名: CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						
04	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液1000mL ソフトパック「テルモ」 療法名: CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴時間 3時間で	0mg 1L		投与順 5						
<次ページあり>											







呼吸器内科

レジメン名称 : CDDP+Weekly VNR

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15							
01	点滴静注	リテム3A 輸液500mL 療法名: CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1							
02	点滴静注	グラセトン静注液3mg「NK」 3mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 9.9mg 100mL									
03	点滴静注	(化)ハルビン注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3							
04	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL		投与順 4							
05	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液1000mL ソフトバック「テルモ」 療法名: CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 1L									
06	点滴静注	ヴァインF輸液 500mL バック 療法名: CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL		投与順 5							
07	点滴静注	リテム3A 輸液500mL 療法名: CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴時間 2時間で	500mL									
	<次ページあり>											

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : CDDP+Weekly VNR

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
		投与経路:末梢サブルート1									
08	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH グラネセトロン静注液3mg「NK」 3mL 療法名:CDDP+Weekly VNR 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL 3mg		投与順 2						

RP	オーダーコメント
02	アプレピタントの併用が推奨。day2、day3にデキサメタゾン8mg投与が推奨。
05	CDDPの分は生食を捨てる