

呼吸器内科

レジメン名称 : 後)biweekly CBDCA+TXT

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2017/8/23 アルコールフリードセタキセルに変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※	30mg/m2		32mg/m2
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		540mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:後)biweekly CBDCA+TXT 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ グレースロン静注液3mg「NK」 3mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)biweekly CBDCA+TXT 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 1A 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:後)biweekly CBDCA+TXT 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:後)biweekly CBDCA+TXT 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						