

呼吸器内科

レジメン名称 : NSCLC Atezolizumab 呼吸器

レジメン説明 : 2018/4/16 承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: $\text{体重(kg)}^{0.425} \times \text{身長(cm)}^{0.725} \times 0.007184$ 女性用: $\text{体重(kg)}^{0.425} \times \text{身長(cm)}^{0.725} \times 0.007184$

AUC計算式 : 男性用: $\text{AUC} \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$ 女性用: $\text{AUC} \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg	1200mg		1200mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: NSCLC Atezolizumab 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注1200mg 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名: NSCLC Atezolizumab 呼吸器 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2又は0.22µmのフィルター使用 認容性が良ければ、2回目以降は30分に短縮可