血液内科					
ブリナツモマブ					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
1コース目1w【2日/2日/3日】ブリナツモマブ 45kg≤	ブリナツモマブ	18 μg	中心静脈注射	day1・3	7
	ブリナツモマブ	27 μg	中心静脈注射	day5	
1コース目day8-28【3日/4日】ブリナツモマブ 45kg≤	ブリナツモマブ	84 μg	中心静脈注射	day1・8・15	35
	ブリナツモマブ	112 μg	中心静脈注射	day4・11・18	
1コース目day8-28【4日/3日】ブリナツモマブ 45kg≤	ブリナツモマブ	112 μg	中心静脈注射	day1・8・15	35
	ブリナツモマブ	84 μg	中心静脈注射	day5・12・19	
【3日/4日交互】ブリナツモマブ 45kg≤ 2-5コース目	ブリナツモマブ	84 μg	中心静脈注射	day1・8・15・22	42
	ブリナツモマブ	112 μg	中心静脈注射	day4・11・18・25	
【3日/4日交互】ブリナツモマブ 45kg≤ 6-9コース目	ブリナツモマブ	84 μg	中心静脈注射	day1・8・15・22	84
	ブリナツモマブ	112 μg	中心静脈注射	day4・11・18・25	
【4日/3日交互】ブリナツモマブ 45kg≤ 2-5コース目	ブリナツモマブ	112 μg	中心静脈注射	day1・8・15・22	42
	ブリナツモマブ	84 μg	中心静脈注射	day5・12・19・26	
【4日/3日交互】ブリナツモマブ 45kg≤ 6-9コース目	ブリナツモマブ	112 μg	中心静脈注射	day1・8・15・22	84
	ブリナツモマブ	84 μg	中心静脈注射	day5・12・19・26	
1コース目day1-7【4日/3日】ブリナツモマブ <45kg	ブリナツモマブ	20 μg/m ²	中心静脈注射	day1	7
	ブリナツモマブ	15 μg/m ²	中心静脈注射	day5	
1コース目day1-7【3日/4日】ブリナツモマブ <45kg	ブリナツモマブ	15 μg/m ²	中心静脈注射	day1	7
	ブリナツモマブ	20 μg/m ²	中心静脈注射	day4	
1コース目day8-28【3日/4日】ブリナツモマブ <45kg	ブリナツモマブ	45 μg/m ²	中心静脈注射	day1・8・15	35
	ブリナツモマブ	60 μg/m ²	中心静脈注射	day4・11・18	
1コース目day8-28【4日/3日】ブリナツモマブ <45kg	ブリナツモマブ	60 μg/m ²	中心静脈注射	day1・8・15	35
	ブリナツモマブ	45 μg/m ²	中心静脈注射	day5・12・19	
【3日/4日交互】ブリナツモマブ <45kg 2-5コース目	ブリナツモマブ	45 μg/m ²	中心静脈注射	day1・8・15・22	42
	ブリナツモマブ	60 μg/m ²	中心静脈注射	day4・11・18・25	
【3日/4日交互】ブリナツモマブ <45kg 6-9コース目	ブリナツモマブ	45 μg/m ²	中心静脈注射	day1・8・15・22	84
	ブリナツモマブ	60 μg/m ²	中心静脈注射	day4・11・18・25	
【4日/3日交互】ブリナツモマブ <45kg 2-5コース目	ブリナツモマブ	60 μg/m ²	中心静脈注射	day1・8・15・22	42
	ブリナツモマブ	45 μg/m ²	中心静脈注射	day5・12・19・26	
【4日/3日交互】ブリナツモマブ <45kg 6-9コース目	ブリナツモマブ	60 μg/m ²	中心静脈注射	day1・8・15・22	84
	ブリナツモマブ	45 μg/m ²	中心静脈注射	day5・12・19・26	
CLL					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
CLL リツキシマブ療法(他剤と併用1コース目/R:375)	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	7
CLL リツキシマブ療法(他剤併用2回目以降/R:500)	リツキシマブ	500 mg/m ²	点滴静注	day1	7
CLL RB (1コース目/R:375)	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	28
	ベンダムスチン	90 mg/m ²	点滴静注	day1・2	
CLL RB (2~6コース目/R:500)	リツキシマブ	500 mg/m ²	点滴静注	day1	28
	ベンダムスチン	90 mg/m ²	点滴静注	day1・2	
CLL ベンダムスチン単独 (総コース数:6)	ベンダムスチン	100 mg/m ²	点滴静注	day1・2	28
PTCL/CTCL					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
プララトレキサート療法	プララトレキサート	30 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15・22・29・36	49
ロミデプシン療法	ロミデプシン	14 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28
A-CHP療法【d2-5:PSL内服】	ドキシルピシン	50 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	シクロフォスファミド	750 mg/m ²	点滴静注	day1	
	ブレンツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg	点滴静注	day1	
Hodgkin					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
ニボルマブ(単剤)療法(Hodgkin)	ニボルマブ	240 mg	点滴静注	day1	14
【q4w】ニボルマブ(単剤)療法(Hodgkin)	ニボルマブ	480 mg	点滴静注	day1	28
アトセトリス単独療法	ブレンツキシマブベドチン	1.8 mg/kg	点滴静注	day1	21
ABVD療法(JCOG変法)	ドキシルピシン	25 mg/m ²	点滴静注	day1・15	28
	ブレオマイシン	10 mg/m ²	点滴静注	day1・15	
	ピンブラスチン	6 mg/m ²	点滴静注	day1・15	
	ダカルバジン	250 mg/m ²	点滴静注	day1・15	

A-AVD療法	ドキシソルピシン	25 mg/m ²	点滴静注	day1・15	28
	ビンブラスチン	6 mg/m ²	点滴静注	day1・15	
	ダカルバジン	375 mg/m ²	点滴静注	day1・15	
	ブレンツキシマブベドチン	1.2 mg/kg	点滴静注	day1・15	
NHL					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
通常量THP-COP療法【PSL内服】	ピラルピシン	50 mg/m ²	点滴静注	day1	14
	シクロfosファミド	750 mg/m ²	点滴静注	day1	
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	点滴静注	day1	
	プレドニゾロン	100 mg/日	経口	day1-5	
高齢者THP-COP療法【PSL内服】	ピラルピシン	30 mg/m ²	点滴静注	day1	14
	シクロfosファミド	500 mg/m ²	点滴静注	day1	
	ピンクリスチン	1 mg/m ²	点滴静注	day1	
	プレドニゾロン	30 mg/日	経口	day1-5	
CHOP療法【PSL内服】	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	点滴静注	day1	14
	シクロfosファミド	750 mg/m ²	点滴静注	day1	
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	点滴静注	day1	
	プレドニゾロン	100 mg/日	経口	day1-5	
【ジ-ラスト BP】CHOP療法【PSL内服】	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	点滴静注	day1	14
	シクロfosファミド	750 mg/m ²	点滴静注	day1	
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	点滴静注	day1	
	プレドニゾロン	100 mg/日	経口	day1-5	
ベンダムスチン	ベンダムスチン	120 mg/m ²	点滴静注	day1・2	21
リツキシマン療法	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	7
リツキシマン維持療法	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	56
【高濃度:4mg/mL】リツキシマン療法	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	7
R-CHOP療法【PSL内服】	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	14
	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	点滴静注	day2	
	シクロfosファミド	750 mg/m ²	点滴静注	day2	
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	点滴静注	day2	
	プレドニゾロン	100 mg/日	経口	day2-6	
【ジ-ラスト BP】R-CHOP療法【PSL内服】	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	14
	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	点滴静注	day2	
	シクロfosファミド	750 mg/m ²	点滴静注	day2	
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	点滴静注	day2	
	プレドニゾロン	100 mg/日	経口	day2-6	
RB	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	28
	ベンダムスチン	90 mg/m ²	点滴静注	day1・2	
PRB療法	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	ベンダムスチン	90 mg/m ²	点滴静注	day1・2	
	ポラツズマブ ベドチン	1.8 mg/kg	点滴静注	day2	
リツキシマブ【BS】療法	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	7
高齢者R-THPCOP療法【PSL内服】リツキシマブBS	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	ピラルピシン	30 mg/m ²	点滴静注	day2	
	シクロfosファミド	500 mg/m ²	点滴静注	day2	
	ピンクリスチン	1 mg/m ²	点滴静注	day2	
	プレドニゾロン	30 mg/日	経口	day2-6	
高齢者R-THPCOP療法(リツキシマブBS同日)PSL内服	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	ピラルピシン	30 mg/m ²	点滴静注	day1	
	シクロfosファミド	500 mg/m ²	点滴静注	day1	
	ピンクリスチン	1 mg/m ²	点滴静注	day1	
	プレドニゾロン	30 mg/日	経口	day1-5	
通常量R-THPCOP療法【PSL内服】リツキシマブBS	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	ピラルピシン	50 mg/m ²	点滴静注	day2	
	シクロfosファミド	750 mg/m ²	点滴静注	day2	
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	点滴静注	day2	
	プレドニゾロン	100 mg/日	経口	day2-6	

通常量R-THPCOP療法(リツキシマブBS同日)PSL内服	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	ピラルピシチン	50 mg/m ²	点滴静注	day1	
	シクロフォスファミド	750 mg/m ²	点滴静注	day1	
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	点滴静注	day1	
	プレドニゾロン	100 mg/日	経口	day1-5	
【高濃度:4mg/mL】リツキシマブBS療法	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	7
Pola-R【BS】-CHP	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	ドキシソルピシチン	50 mg/m ²	点滴静注	day2	
	シクロフォスファミド	750 mg/m ²	点滴静注	day2	
	ポラツズマブ ベドチン	1.8 mg/kg	点滴静注	day2	
	プレドニゾロン	100 mg/日	経口	day2-6	
【ゾーラスタ BP】Pola-R【BS】-CHP	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	21
	ドキシソルピシチン	50 mg/m ²	点滴静注	day2	
	シクロフォスファミド	750 mg/m ²	点滴静注	day2	
	ポラツズマブ ベドチン	1.8 mg/kg	点滴静注	day2	
	プレドニゾロン	100 mg/日	経口	day2-6	
オビヌツズマブ					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
オビヌツズマブ療法(導入療法 1コース目)	オビヌツズマブ	1000 mg	点滴静注	day1・8・15	21
オビヌツズマブ療法(導入療法 2コース目以降)	オビヌツズマブ	1000 mg	点滴静注	day1	21
オビヌツズマブ療法(維持療法)	オビヌツズマブ	1000 mg	点滴静注	day1	56
GB療法(G:2コース目以降)	オビヌツズマブ	1000 mg	点滴静注	day1	28
	ベンダムスチン	90 mg/m ²	点滴静注	day1・2	
エプコリタマブ					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
エプコリタマブ皮下注<1コース目>	エプコリタマブ	0.16 mg	皮下注射	day1	28
	エプコリタマブ	0.8 mg	皮下注射	day8	
	エプコリタマブ	48 mg	皮下注射	day15・22	
エプコリタマブ皮下注<2,3コース目>	エプコリタマブ	48 mg	皮下注射	day1・8・15・22	28
エプコリタマブ皮下注<4~9コース目>	エプコリタマブ	48 mg	皮下注射	day1・15	28
エプコリタマブ皮下注<10コース目以降>	エプコリタマブ	48 mg	皮下注射	day1	28
Isad療法					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
Isad療法(1コース目)【75歳未満】	イサツキシマブ	20 mg/kg	点滴静注	day1・8・15・22	28
	デキサメタゾン	40 mg	点滴静注	day1・8・15・22	
Isad療法(2コース目以降)【75歳未満】	イサツキシマブ	20 mg/kg	点滴静注	day1・15	28
	デキサメタゾン	40 mg	点滴静注	day1・15	
Isad療法(1コース)【75歳以上】	イサツキシマブ	20 mg/kg	点滴静注	day1・8・15・22	28
	デキサメタゾン	20 mg	点滴静注	day1・8・15・22	
Isad療法(2コース目以降)【75歳以上】	イサツキシマブ	20 mg/kg	点滴静注	day1・15	28
	デキサメタゾン	20 mg	点滴静注	day1・15	
DRd療法					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
DRd療法(1,2コース)【ダラキューロ】	ダラキューロ	15 mL	皮下注射	day1・8・15・22	28
	レナリドミド	25 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
DRd療法(3~6コース)【ダラキューロ】	ダラキューロ	15 mL	皮下注射	day1・15	28
	レナリドミド	25 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
DRd療法(7コース以降)【ダラキューロ】	ダラキューロ	15 mL	皮下注射	day1	28
	レナリドミド	25 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day8・15・22	
DBd療法					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
DBd療法(1-3コース)【ダラキューロ】	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注射	day1・4・8・11	21
	ダラキューロ	15 mL	皮下注射	day1・8・15	
	デキサメタゾン	20 mg/日	経口	day1・2・4・5・8・9・11・12	

DBd療法(4-8コース)【ダラキューロ】	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注射	day1・4・8・11	21
	ダラキューロ	15 mL	皮下注射	day1	
	デキサメタゾン	20 mg/日	経口	day1・2・4・5・8・9・11・12	
DBd療法(9コース以降)【ダラキューロ】	ダラキューロ	15 mL	皮下注射	day1	21
	デキサメタゾン	20 mg/日	経口	day1・2・4・5・8・9・11・12	
Elranatamab療法					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
Elranatamab療法<1コース目>	エルラナタマブ	12 mg	皮下注射	day1	28
		36 mg	皮下注射	day4	
		76 mg	皮下注射	day8・15・22	
Elranatamab療法<2-6コース目>	エルラナタマブ	76 mg	皮下注射	day1・8・15・22	28
Elranatamab療法<7コース目以降>	エルラナタマブ	76 mg	皮下注射	day1・15	28
BD療法					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
【導入】BD(ボルテゾミブ・デキサメタゾン)皮下注	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注射	day1・4・8・11	21
	デキサメタゾン	20 mg/日	経口	day1・2・4・5・8・9・11・12	
【維持】BD(ボルテゾミブ・デキサメタゾン)皮下注	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注射	day1・8・15・22	35
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
KRd療法					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
KRd療法(1コース目)	カルフィルゾミブ	20 mg/m ²	点滴静注	day1・2	28
	カルフィルゾミブ	27 mg/m ²	点滴静注	day8・9・15・16	
	レナリドミド	25 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
KRd療法(2~12コース目)	カルフィルゾミブ	27 mg/m ²	点滴静注	day1・2・8・9・15・16	28
	レナリドミド	25 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
KRd療法(13~18コース目)	カルフィルゾミブ	27 mg/m ²	点滴静注	day1・2・15・16	28
	レナリドミド	25 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
Kd療法					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
Kd療法(1コース目)	カルフィルゾミブ	20 mg/m ²	点滴静注	day1・2	28
	カルフィルゾミブ	56 mg/m ²	点滴静注	day8・9・15・16	
	デキサメタゾン	20 mg/日	経口	day1・2・8・9・15・16・22・23	
Kd療法(2コース目以降)	カルフィルゾミブ	56 mg/m ²	点滴静注	day1・2・8・9・15・16	28
	デキサメタゾン	20 mg/日	経口	day1・2・8・9・15・16・22・23	
Kd療法(週1回/1コース目)	カルフィルゾミブ	20 mg/m ²	点滴静注	day1	28
	カルフィルゾミブ	70 mg/m ²	点滴静注	day8・15	
	デキサメタゾン	20 mg/日	経口	day1・2・8・9・15・16・22・23	
Kd療法(週1回/2コース目以降)	カルフィルゾミブ	70 mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28
	デキサメタゾン	20 mg/日	経口	day1・2・8・9・15・16・22・23	
ERd療法					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
ERd療法(1, 2コース目)	エロツズマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1・8・15・22	28
	レナリドミド	25 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
ERd療法(3コース目以降)	エロツズマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1・15	28
	レナリドミド	25 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
EPd療法(1, 2コース目)	エロツズマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1・8・15・22	28
	ボマリドミド	4 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
EPd療法(3コース目以降)	エロツズマブ	20 mg/kg	点滴静注	day1	28
	ボマリドミド	4 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	

IsaPd療法					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
IsaPd療法(1コース)【75歳未満】	イサツキシマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1・8・15・22	28
	ボマリドミド	4 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
IsaPd療法(2コース目以降)【75歳未満】	イサツキシマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1・15	28
	ボマリドミド	4 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
IsaPd療法(1コース)【75歳以上】	イサツキシマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1・8・15・22	28
	ボマリドミド	4 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	20 mg/日	経口	day1・8・15・22	
IsaPd療法(2コース目以降)【75歳以上】	イサツキシマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1・15	28
	ボマリドミド	4 mg/日	経口	day1-21	
	デキサメタゾン	20 mg/日	経口	day1・8・15・22	
IsaKd療法					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
IsaKd療法(1コース目)	カルフィルゾミブ	20 mg/m ²	点滴静注	day1・2	28
	カルフィルゾミブ	56 mg/m ²	点滴静注	day8・9・15・16	
	イサツキシマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1・8・15・22	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
IsaKd療法(2コース目以降)	カルフィルゾミブ	56 mg/m ²	点滴静注	day1・2・8・9・15・16	28
	イサツキシマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1・15	
	デキサメタゾン	40 mg/日	経口	day1・8・15・22	
アザシチジン					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
アザシチジン(皮下注)	アザシチジン	75 mg/m ²	皮下注射	day1-7	28
ITP					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
リツキシマブ療法(ITP)	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	day1	7
MSI-High					
レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与日	投与間隔
Pembrolizumab MSI-High 血内	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	day1	21
【q6w】Pembrolizumab MSI-High 血内	ペムブロリズマブ	400 mg	点滴静注	day1	42