

## 産業医科大学病院 受け入れに係る提出書類について

1. 病院内で受け入れる者は、(1)及び(2)を事前に提出するものとする。
2. (2)について、基準値を満たしていない場合は、「麻疹、風疹、水痘、ムンプス」のワクチンを1歳以上で2回接種済み、「B型肝炎」のワクチンを3回接種済みであれば、抗体価の値に係わらず受け入れ可能とし、(3)を提出するものとする。

(1) 健康診断書の写し（胸部X線・ツベルクリン反応等、結核について確認できるもの）  
 ※実習開始日より1年以内に受診したもの

(2) 「麻疹、風疹、水痘、ムンプス」については表1、B型肝炎については表2を満たした検査結果等の写し

表1 「麻疹、風疹、水痘、ムンプス」抗体価基準値と追加予防接種回数

	測定方法	今すぐの 予防接種は不要	あと1回の 追加接種が必要	あと2回の 追加接種が必要
麻疹	EIA法(IgG)	16.0以上	2.0以上16未満	2.0未満
	中和法	1:8以上	1:4	1:4未満
	FIA法(F)	抗体価1.5AI以上	抗体価0.4AI以上1.5AI未満	抗体価0.4AI未満
風疹	HI法	1:32以上	1:8、1:16	1:8未満
	EIA法(IgG)(A)	8.0以上	2.0以上8.0未満	2.0未満
	EIA法(IgG)(B)	30IU/mL以上	30IU/mL未満	△A0.100未満※陰性
	LTI法(C)	30IU/mL以上	6以上30IU/mL未満	6IU/mL未満
	CLEIA法(D)	45IU/mL以上	10以上45IU/mL未満	10IU/mL未満
	CLEIA法(E)	抗体価14以上	抗体価4以上14未満	抗体価4未満
	FIA法(F)	抗体価3.0AI以上	抗体価1.0以上3.0AI未満	抗体価1.0AI未満
	FIA法(G)	30IU/mL以上	10以上30IU/mL未満	10IU/mL未満
	CLIA法(H)	25IU/mL以上	10以上25IU/mL未満	10IU/mL未満
ELFA法(I)	45IU/mL以上	10以上45IU/mL未満	10IU/mL未満	
水痘	EIA法(IgG)	4.0以上	2.0以上4.0未満	2.0未満
	IAHA法	1:4以上	1:2	1:2未満
	中和法	1:4以上	1:2	1:2未満
	FIA法(F)	抗体価0.5AI以上	抗体価0.3AI以上0.5AI未満	抗体価0.3AI未満
ムンプス	EIA法(IgG)	4.0以上	2.0以上4.0未満	2.0未満
	FIA法(F)	抗体価1.3AI以上	抗体価0.7AI以上1.3AI未満	抗体価0.7未満

表2 「B型肝炎」抗体価基準値と追加予防接種回数

	項目	基準値	判定
(1)抗体価検査	CLIA法 (HBs抗体)	10mIU/ml以上	今すぐの予防接種は不要
		10mIU/ml未満	あと1回の追加接種が必要

※場合によっては2回必要

(2)予防接種	追加接種 1回目	10mIU/ml以上	追加接種は不要
		10mIU/ml未満	あと2回の追加接種が必要
	追加接種 2・3回目	10mIU/ml以上が望ましい	3回の接種で受け入れ可とする

※(1)→(2)の順に確認・追加依頼をする

- (3) 「麻疹、風疹、水痘、ムンプス」のワクチンを2回接種済み、「B型肝炎」のワクチンを3回接種済の証明書(母子手帳等)の写し

[2026年1月9日 病院管理課、感染制御部]